

Según el **DSM-V** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación de Psiquiatría Americana se diagnostica un Trastorno por consumo de _____
(SUSTANCIA).

A. Un modelo problemático de consumo de _____
(SUSTANCIA) que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses:

1. Se consume _____
(SUSTANCIA) con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de _____
(SUSTANCIA).

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir _____
(SUSTANCIA), consumirlo o recuperarse de sus efectos.

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir _____
(SUSTANCIA).

5. Consumo recurrente de _____
(SUSTANCIA) que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar.

6. Consumo continuado de _____
(SUSTANCIA) a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del mismo.

7. El consumo de _____
(SUSTANCIA) provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio.

8. Consumo recurrente de _____
(SUSTANCIA) en situaciones en las que provoca un riesgo físico.

9. Se continúa con el consumo de _____
(SUSTANCIA) a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el mismo.

10. Tolerancia, definida por alguno de los signos siguientes:

a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de _____
(SUSTANCIA) para conseguir la intoxicación o el efecto deseado.

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de _____
(SUSTANCIA).

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los signos siguientes:

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico de _____
(SUSTANCIA).

b. Se consume _____
(SUSTANCIA) (o alguna sustancia similar) para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia.